

◆乳幼児の定期予防接種の種類と受け方 接種料金は無料(自治体負担)◆

(令和2年4月1日現在)

予防接種名	種類	予防できる病気	対象	回数	標準的な接種年齢	接種間隔	接種方法 接種量	その他
乾燥 ヘモフィルスb型 ワクチン (ヒ7ワクチン)	不活化 ワクチン	インフルエンザ菌b 型による、細菌 性髄膜炎、肺 炎、敗血症など	生後2ヶ月 ～60ヶ月 未満	初回接種 3回 (生後12ヶ月ま でに完了)	接種開始は 生後2ヶ月 ～6ヶ月以内	27日～56日(医師が認める 場合は20日～56日)	0.5ml 皮下注射	◆接種開始が生後7ヶ月～11ヶ月以内の 場合は初回接種2回(生後12ヶ月までに完了) +追加接種1回 ◆接種開始が生後12ヶ月～59ヶ月以内の場 合は1回
				追加接種 1回	初回接種3回目終了後 7ヶ月～13ヶ月の間			
小児用 肺炎球菌 ワクチン	不活化 ワクチン	肺炎球菌による 細菌性髄膜炎、肺炎、重い 中耳炎など	生後2ヶ月 ～60ヶ月 未満	初回接種 3回 (生後12ヶ月ま でに完了)	接種開始は 生後2ヶ月 ～6ヶ月以内	27日以上	0.5ml 皮下注射	◆接種開始が生後7ヶ月～11ヶ月以内の場合 は初回接種2回(生後24ヶ月までに完了)+追 加接種1回 ◆接種開始が生後12ヶ月～23ヶ月以内の場合 は2回(間隔は60日以上) ◆接種開始が生後24ヶ月～59ヶ月以内の場合 は1回
				追加接種 1回	初回接種3回目終了後60日以上 経過した後の生後12ヶ月以降 (標準は生後12ヶ月～15ヶ月)			
B型肝炎 ワクチン	不活化 ワクチン	B型肝炎	1歳に至るまで (1歳未満)	3回	生後2ヶ月～ 生後8ヶ月以内	◆1回目終了後、27日 以上あけて2回目を接種 ◆1回目の接種から139日 以上あけて3回目を接種	0.25ml 皮下注射	※HBs抗原陽性の者の胎内又は産道にお いてB型肝炎ウイルスに感染するおそれのあ る者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投 与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの 投与を受けたことのある者は対象外です
四種混合	不活化 ワクチン	百日せき ジフテリア 破傷風 ポリオ	生後3ヶ月 ～90ヶ月 未満	初回接種 3回	生後3ヶ月 ～11ヶ月以内	20～56日	0.5ml 皮下注射	
				追加接種 1回	初回接種3回目終了後 12ヶ月～18ヶ月の間			

※ 二種混合…ジフテリア・破傷風は小学6年生(11歳～12歳)時に接種します。(個別通知あり)

BCG	生 ワクチン	結核性髄膜炎 粟粒結核	生後12ヶ月 未満	1回	生後5ヶ月～7ヶ月以内		スタンプ方式で 上腕2ヶ所に 押し付ける	※生後12ヶ月を超えた場合は <b>任意接種</b> となります
麻しん・風しん 混合ワクチン	生 ワクチン	麻しん 風しん	1期:生後12ヶ月 ～24ヶ月未満	1回	1期:生後12ヶ月～23ヶ月以内		0.5ml 皮下注射	◆1期および2期の合計2回接種を受けるこ とにより強固な免疫を獲得します ◆2期は該当年度に個別通知します
			2期:小学校就学 1年前の年度	1回	2期:小学校就学1年前の年度			
水痘ワクチン	生 ワクチン	水痘 (水ぼうそう)	生後12ヶ月～ 36ヶ月未満	2回	1回目:生後12ヶ月 ～15ヶ月 2回目:1回目接種後 6ヶ月～12ヶ月	1回目接種後3ヶ月以上 (標準的には6ヶ月～12ヶ 月)の間隔をおいて2回目 接種	0.5ml 皮下注射	◆合計2回接種を受けることにより強固な免 疫を獲得します ◆既に水痘にかかったことのある者は定期 接種の対象外です
日本脳炎 ワクチン	不活化 ワクチン	日本脳炎	1期:生後6ヶ月 ～90ヶ月 未満	1期初回接種 2回	3歳以上4歳未満	1期初回接種は6日以上、 標準的には6日～28日ま での間隔をおいて2回接 種	【3歳以上】 0.5ml 皮下注射	
				1期追加接種 1回	4歳以上5歳未満	1期追加接種は初回接種 終了後6ヶ月以上、標準的 にはおむね1年を経過し た時期に1回接種		
			2期:9歳以上 13歳未満	1回	小学4年生(9歳～10歳)		0.5ml 皮下注射	◆2期は小学4年生(9歳～10歳)時に個別通 知します



※ 何らかの事情により標準接種間隔を超えてしまった場合は保健係までご相談ください

※ 乳幼児の定期予防接種は接種年齢が予防接種法の範囲を超えた場合、**任意接種で自己負担(有料)**となります。

◆接種間隔の注意◆



◆◆ 定期予防接種の接種間隔具体例 ◆◆

不活化ワクチン ヒブワクチン	初回免疫 27～56日間 あける	不活化ワクチン ヒブワクチン		不活化ワクチン 四種混合 (・百日咳・ジフテリア ・破傷風 ・小児マヒ(ポリオ))	初回免疫 20～56日間 あける	不活化ワクチン 四種混合	
	6日以上あける	生ワクチン BCG 麻しん風しん 水痘	不活化ワクチン 四種混合・B型肝炎 小児用肺炎球菌 日本脳炎		6日以上あける	生ワクチン BCG 麻しん風しん 水痘	不活化ワクチン ヒブ・小児用肺炎球菌 B型肝炎・日本脳炎
不活化ワクチン 小児用 肺炎球菌ワクチン	初回免疫 27日以上あける	不活化ワクチン 小児用肺炎球菌ワクチン		不活化ワクチン 日本脳炎	1期初回は 6～28日 あける	不活化ワクチン 日本脳炎	
	6日以上あける	生ワクチン BCG 麻しん風しん 水痘	不活化ワクチン 四種混合・B型肝炎 ヒブ・日本脳炎		6日以上あける	生ワクチン BCG・水痘 麻しん風しん	不活化ワクチン ヒブ・小児用肺炎球菌 四種混合・B型肝炎
不活化ワクチン B型肝炎ワクチン	1回目から2回目の接種は 27日以上あける	不活化ワクチン		生ワクチン 水痘	初回接種後3ヶ月以上 あける	生ワクチン 水痘	
	2回目から3回目の接種は 6日以上あけ、 1回目から3回目は 139日以上あける	B型肝炎ワクチン			27日以上あける	生ワクチン BCG 麻しん風しん	不活化ワクチン 四種混合 ヒブ・小児用肺炎球菌 B型肝炎 日本脳炎
	6日以上あける	生ワクチン BCG 麻しん風しん 水痘	不活化ワクチン ヒブ・小児用肺炎球菌 四種混合・日本脳炎		27日以上あける	生ワクチン 水痘・BCG 麻しん風しん	