

◆ 子どもの定期予防接種の種類と受け方 ◆

接種料金は無料(自治体負担)

(令和8年4月1日現在)

予防接種名	種類	予防できる病気	対象	回数	標準的な接種年齢	接種間隔	接種方法 接種量	その他
ロタウイルス ワクチン	経口生 ワクチン	下痢・嘔吐を主 徴とするロタウ イルスによる胃 腸炎	【ロタリックス(1価)】 生後6週0日後～ 生後24週0日後まで	2回	1回目は生後2ヶ月～ 生後14週6日までに 接種し、2回目は生後 24週0日後まで	27日以上	1. 5mL 経口接種	・ワクチンが2種類(ロタリックス、ロ タテック)があるが、どちらを接種しても 有効性に差はありません。 ・1回目接種は、安全性の観点から 生後14週6日後までが望ましい(生 まれた日を0日として計算)。 ・1～3回目は原則として同じ種類の ワクチンを接種。
			【ロタテック(5価)】 生後6週0日後～ 生後32週0日後まで	3回	1回目は生後2ヶ月～ 生後14週6日までに 接種し、2・3回目は生 後32週0日後まで		2. 0mL 経口接種	
小児用 肺炎球菌 ワクチン	不活化 ワクチン	肺炎球菌による 細菌性髄膜炎、 肺炎、重い中耳 炎など	生後2ヶ月 ～60ヶ月未満	初回接種 3回 (生後24ヶ月までに 完了)	生後2ヶ月～6ヶ月以 内に接種開始し、生後 12ヶ月までに3回接種	27日以上	0. 5mL 皮下又は 筋肉内注射	・令和6年10月から原則として20価 ワクチンを使用します。 ・接種開始が生後7ヶ月～11ヶ月以 内の場合は初回接種2回(生後24ヶ 月までに完了)、追加接種1回。 ・接種開始が生後12ヶ月～23ヶ月以 内の場合は2回接種(間隔は60日以 上)。 ・接種開始が生後24ヶ月～59ヶ月以 内の場合は1回接種。
				追加接種 1回				
B型肝炎 ワクチン	不活化 ワクチン	B型肝炎	1歳未満	3回	生後2ヶ月～ 生後8ヶ月以内	・1回目終了後、27日以 上あけて2回目を接種 ・1回目の接種から139 日以上あけて3回目を 接種	0. 25mL 皮下注射	・HBs抗原陽性の者の胎内又は産 道においてB型肝炎ウイルスに感染 するおそれのある者で、抗HBs人 免疫グロブリンの投与に併せて組換え 沈降B型肝炎ワクチンの投与を受け たことのある者は対象外です。
五種混合	不活化 ワクチン	・百日せき ・ジフテリア ・破傷風 ・ポリオ ・インフルエンザ ^a 菌 ^b 型による細菌性 髄膜炎など	生後2ヶ月 ～90ヶ月未満	初回接種 3回	接種開始は 生後2ヶ月 ～7ヶ月未満	20～56日	0. 5mL 皮下又は 筋肉内注射	・令和6年4月から定期接種になりま した。 ・1つのワクチンで5つの感染症を予 防する効果が期待できます。
				追加接種 1回	初回接種3回目終了後6ヶ月以上 (標準的には3回目終了後6ヶ月～18ヶ月)			
二種混合	不活化 ワクチン	ジフテリア 破傷風	11歳～13歳未満	1回	11歳(小学6年生に個別通知)		0. 1mL 皮下注射	・乳児期に三種混合または四種混 合を接種した方に、追加免疫をつけ るために接種します。
BCG	注射生 ワクチン	結核性髄膜炎 粟粒結核	生後12ヶ月未満	1回	生後5ヶ月～7ヶ月以内		スタンプ方 式で上腕2ヶ所 に押し付ける	・生後12ヶ月を超えた場合は、任意 接種となります。
麻しん 風しん 混合ワクチン	注射生 ワクチン	麻しん 風しん	1期 生後12ヶ月～ 24ヶ月未満	1回	生後12ヶ月～23ヶ月以内	0. 5mL 皮下注射	・1期および2期の合計2回接種を受 けることでより強固な免疫を獲得し ます。 ・2期は該当年度に個別通知しま す。	
			2期 小学校就学 1年前の年度	1回	小学校就学1年前の年度			
水痘ワクチン	注射生 ワクチン	水痘 (水ぼうそう)	生後12ヶ月～ 36ヶ月未満	2回	1回目:生後12ヶ月 ～15ヶ月 2回目:1回目接種後 6ヶ月～12ヶ月	1回目接種後3ヶ月以 上(標準的には6ヶ月～ 12ヶ月)の間隔をおい て2回目接種	0. 5mL 皮下注射	・合計2回接種を受けることでより強 固な免疫を獲得します。 ・既に水痘にかかったことのある者 は定期接種の対象外です。
日本脳炎 ワクチン	不活化 ワクチン	日本脳炎	1期 生後6ヶ月 ～90ヶ月 未満	1期初回接種 2回	3歳以上 4歳未満	6日以上、標準的には6日～28日ま での間隔をおいて2回接種	【3歳以上】 0. 5mL 皮下注射	・1期の初回案内は、3歳になる年度 に個別通知します。 
				1期追加接種 1回	4歳以上 5歳未満	初回接種終了後6ヶ月以上、標準 的にはおおむね1年を経過した時 期に1回接種	【3歳未満】 0. 25mL 皮下注射	
			2期 9歳以上 13歳未満	1回	9歳(小学4年生に個別通知)	0. 5mL 皮下注射		
子宮頸がん ワクチン (HPVワクチン)	不活化 ワクチン	ヒトパピローマ ウイルス(HPV) の感染症を防 ぎ、子宮頸がん などの発症を 予防します	小学6年生～高校1年 生相当の年齢の女子	2回もしくは3回 *接種開始年齢 で異なります	中学1年生	標準的な接種間隔 【1回目接種が15歳未満:2回接種】 ・1回目接種後少なくとも5ヶ月以上 (通常6ヶ月以上)の間隔をおいて2 回接種 【1回目接種が15歳以上:3回接種】 ・1回目と2回目は2ヶ月以上の間 隔をおき、2回目と3回目は6ヶ月以 上の間隔をおく	0. 5mL 筋肉内注射	・中学1年生以上の対象となる方に 個別案内を送付します。小学6年生 で接種を希望する方は予診票等を 送付しますので、市保健係へご連絡 ください。 ・ワクチンの効果やリスクについて は、市の説明書や厚生労働省リーフ レット等でご確認ください。 ・令和8年4月から使用するワクチン は、9価ワクチン(シルガード)のみに なります。

★ 令和8年度定期予防接種実施医療機関 ★


医療機関	中條医院	南清水沢診療所	夕張市立診療所
住所	紅葉山526-40	南清水沢4丁目	若菜8番地
電話	TEL 0123-58-2350	TEL 0123-59-7085	TEL 0123-57-7781
医院長名	中條 俊博	立花 康人	諫山 治彦
日程	毎週 月曜日(他の曜日は要相談) 午後2時～4時 事前予約制	毎週 水曜日 午後2時～4時 事前予約制	毎週 木曜日 午後4時～5時30分 事前予約制

※事前に各医療機関に予約が必要です。希望日の1週間前までにご予約ください。

◆◆ 接種間隔の注意 ◆◆

【異なるワクチンの接種間隔】

注射生ワクチンと注射生ワクチンの間のみ接種してから27日以上あけ、その他のワクチンの間隔には制限はありません。



【同じワクチンの接種間隔】

同じワクチンを複数回接種する時の接種間隔は、上記「乳幼児の定期予防接種の種類と受け方」の「接種間隔」のとおりですので、ご確認ください。

※接種間隔など不明なことは、市保健係(TEL0123-52-3106)へご相談ください。